

PTAK

PO ZDERZENIU
Z SZYBĄ



CO ROBIĆ?

PTAK PO ZDERZENIU Z SZYBĄ, CO ROBIĆ?

Ptaka po kolizji z szybą jest zwykle mocno oszołomiony, przez co zupełnie bezbronny. W tym czasie staje się łatwą ofiarą drapieżników, takich jak koty, psy czy kuny. Aby do tego nie dopuścić, nie pozostawiamy obojętni, koniecznie zaopiekujemy się ofiarą kolizji.



JAK TO ZROBIĆ?

Chwytny ptaka w bezpieczny dla niego i dla nas sposób. Jeśli ptak przed nami ucieka (np. podlatuje lub biegnie) możemy pomóc sobie w jego schwytaniu, wykorzystując do tego celu jakiś delikatny materiał, który narzucamy na ptaka (np. chusta, koszula itp.).

JAK TO ZROBIĆ?



Wkładamy ptaka do bezpiecznego pojemnika z dostępem do świeżego powietrza np. kartonu, którego dno możemy wyścielić np. papierowym ręcznikiem, aby ptak się nie ślizgał.



Postępujemy według zasady **3xC: cicho, ciemno, ciepło** (dzięki temu uszkodzony ptak poczuje się bezpiecznie). Ważne jest, aby się nie wychłodził, a w upalne dni należy go chronić przed przegrzaniem.

JEŚLI...

Jeśli ptak nie doznał poważniejszych urazów to po upływie kilkudziesięciu minut (lub nawet kilku godzin) powinien być gotowy do wypuszczenia na wolność (ptak podskakuje, jest ożywiony, próbuje wydostać się z pojemnika). Najlepiej jeśli wypuścimy go w pobliżu miejsca znalezienia (oczywiście z dala od szyb).



Jeżeli zdarzenie miało miejsce w godzinach porannych lub południowych, ptaka możemy wypuścić tego samego dnia. Jeśli jednak miało ono miejsce późnym popołudniem lub wieczorem, bezpieczniej będzie wypuścić go następnego dnia rano (pamiętając o odpowiednim karmieniu i pojeniu w czasie przetrzymywania).

UWAGA!

Gdy zauważymy, że ptak krwawi, np. z dzioba, kończyn możemy do momentu wizyty u lekarza próbować delikatnie zatamować krwotok przy użyciu gazików lub czystych chusteczek higienicznych. Jednak jeśli nie czujemy się pewni nie próbujemy samodzielnie tamować krwawienia.

Jeśli zauważymy: opuszczone powieki/ę, asymetrię czaszki, opuszczone skrzydło/a lub problemy z utrzymaniem równowagi, wówczas niezwłocznie należy udać się do lekarza weterynarii. W żadnym wypadku nie próbujemy samodzielnie nastawiać złamanych kończyn.

W każdej sytuacji warto nawodnić ptaka, poprzez podanie mu do dzioba wody (gdy niechętnie go otwiera, możemy wkrapiać krople wody, np. za pomocą strzykawki przez otwory nosowe – tylko nie pod bieżącą wodą! Możemy również podawać wodę na kąciki dzioba). Podawajmy płyny w ilości max. 5% masy ciała ptaka.

GDZIE SZUKAĆ POMOCY?

U lekarza weterynarii lub w ośrodku rehabilitacji dla dzikich zwierząt (wykaz takich ośrodków znajduje się na stronie **Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska**).

WARTO PAMIĘTAĆ!

Pierwszą pomoc ptak-ofiara kolizji z szybą
otrzymuje od nas
To my ratujemy jego życie !



www.szklanepulapki.pl